

# お薬情報提供文書

## 様

緊急避妊用女性ホルモン剤  
□ノルレボ（OTC医薬品）

服用日時： 年 月 日  
AM・PM 時 分

### 服用された方への注意

- この薬を服用しても、完全に妊娠が回避できるものではなく、妊娠・異常妊娠となる場合もあります。
- この薬の効果は、服用後すぐにわかるわけではありません。3週間後に妊娠検査薬又は産婦人科受診により、妊娠の有無を必ず確認してください。予定の確認方法： □妊娠検査薬 □産婦人科医受診
- 服用後、妊娠の有無にかかわらず出血することがあります。出血があっても生理とは限りません。
- 生理と生理の間の日数（月経周期）や生理時の出血量に一時的な変化が見られることがあります。
- 服用後、頭痛、めまい、腹痛、倦怠感、眠くなるなどの症状があらわれることがあります。また、一時的ですが気持ちが悪くなったり、吐いたりする場合があります。この薬を服用後2時間以内に吐いてしまった場合は、購入した薬局にすぐに相談してください。
- セイヨウオトギリソウ（セントジョンズ・ワート）含有のサプリメントやハーブの摂取はしないように気をつけてください。
- この薬を服用しても、性感染症の予防にはなりません。心配な場合は医師に相談してください。
- 服用後も無防備な性交が行われた場合、妊娠する可能性が高まるので、妊娠を避けたいのであれば、服薬後次回きちんと生理開始までに性交を持たないか、適切な避妊を行ってください。自分に合った避妊法については、医師または薬剤師に相談してください。
- 下腹部の痛みや不正出血があった場合には、流産ないしは子宮外妊娠などの異常妊娠の可能性があるので、速やかに産婦人科を受診してください。
- 授乳中の方：  
・この薬の成分は母乳中に移行するため、授乳中の方は、服用後少なくとも24時間は授乳しないでください。
- 経口避妊薬（低用量ピル）の飲み忘れたために緊急避妊薬を服用した方：  
・緊急避妊薬を服用後、12時間以内に低用量ピルを再開してください。その際には、消退出血が遅れる可能性があります。
- 薬剤師から「今回よりも前の性交で妊娠した可能性を、現時点では否定できない」と言われた方：  
・現時点では今回よりも前の性交による妊娠の可能性を妊娠検査薬で否定できないため、服用3週間後にも妊娠検査薬又は産婦人科受診により、妊娠の有無を必ず確認してください。  
・妊娠している場合、妊娠初期に服用することになりますが、この薬の服用によって胎児の奇形、流産等の発現割合は、服用していない場合と比較して差は認められていません（服薬の有無にかかわらず、胎児の先天異常は一定割合存在します）。

**この薬の効果は、服用後すぐにわかるわけではありません。服用された方は、必ず、3週間後に妊娠検査薬での確認又は産婦人科を受診して医師の診察を受けてください。**

（産婦人科での診療は、診療内容によって自費診療の場合もあれば保険診療（健康保険証が必要）の場合もあります）

**受診の際には、この【お薬情報提供文書】を持参してください。**

年 月 日

«緊急避妊の対面診療が可能な  
産婦人科医療機関等の一覧»  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912\\_00002.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912_00002.html)  
(厚生労働省ホームページ)



薬局名：  
薬剤師名：  
所在地：  
電話番号：  
連携医療機関名：